

Eerste keuze Mastitis-injectoren

Vanaf 2017 is het verplicht om een eerste keuze injector voor handen te hebben op het BBP (en op het bedrijf). In principe moet men net als bij injectie-antibiotica kiezen voor een 1e keuzemiddel, en alleen bij ernstige gevallen mag een tweede keus injector worden gebruikt. Onder ernstige gevallen verstaan we koeien met hoge koorts en/of algemeen ziek zijn (bv. Coli of Klebsiella).

Om het allemaal nog wat duidelijker en inzichtelijker te maken zullen we vanaf heden stickers op de dozen injectoren plakken.



1e keuze injectoren die wij op de plank hebben:

1. Ubropen injector

Ubropen is een eerste keuze injector die gebruikt kan worden voor mastitis bij melkgevende runderen (penicillinegevoelige streptokokken of stafylokokken).


Dosering: éénmaal per dag één injector, 3-5dg. Groot voordeel is dus mogelijks variabele behandelingsduur, terwijl je bij andere injectoren altijd minimaal 1 of 2 volledige kuren moet toepassen.

Wachttijd melk: 6dg, vlees: 3dg.



2. Orbenin Lactation

- Indicatie: milde mastitis (veroorzaakt door gram + bacteriën) en subklinische mastitis
- Dosering : 3 toedieningen per geïnfecteerd kwartier, één injector toegediend elke 48 uur
- Wachtijd : Melk: 4dg, Vlees: 7 dg.



Weet u niet zeker welke kiem er speelt op uw bedrijf? Neem af en toe een melkmonster, en stuur deze in. Wij adviseren sowieso om van elk mastitis-geval een melkmonster te nemen en in te vriezen. Geneest een koe dan niet/slecht, dan kunt u dit monster nog altijd achteraf laten onderzoeken op kiem en gevoeligheid.