

# Herkauwerspraktijk



# Veterinair Centrum Someren

## NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022



## Kort nieuws

### NIEUW TELEFOONNUMMER 0493-441032

Sinds kort is er voor de herkauwers een direct telefoonnummer! Bel **0493- 441032**, om direct een rundvee assistente te spreken. Ook op het oude nummer zijn we nog gewoon bereikbaar, kies dan optie 2 in het keuze-menu!

### BOERENAVOND Woensdagavond 14 December

Miel Hostens, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en Gent zal deze avond een presentatie geven over transitie management.

Inloop: 20:00

Start programma: 20:30

Locatie: Heidehof, Kerkendijk 126, Someren-Heide

### KOEKOMPAS veehouders gedeelte invullen

Het Koekompas seizoen is weer begonnen. Bij deze een reminder om alvast het veehouders gedeelte in te vullen. Voor de Campina veehouders kan dit via "melkweb", voor de andere veehouders via "Z-net". Vergeet ook niet het Koekompas te ondertekenen als de dierenarts hem heeft ingediend.

## Scherp in

Het komt regelmatig voor dat we worden gebeld voor een koe met verschijnselen van scherp. Als koeien een scherp voorwerp opvreten, komt dat onderin de netmaag terecht. Door pensbewegingen kan dit voorwerp in of zelfs door de maagwand prikken en een ontsteking veroorzaken van de maag, maar ook de omliggende organen.

De klachten zijn afhankelijk van de mate van ontsteking. Bij milde gevallen zien we vaak een plotse daling in productie en eetlust, die met antibiotica en pijnstillers na enkele dagen weer herstelt. Bij de ernstige gevallen zien we vaak een ontsteking van omliggende organen (hart, longen, borst- en buikvlies) die resulteren in chronische ontstekingen en een wegwijnende koe.

Via de bek ingebrachte kooimagneten kunnen het scherpe voorwerp vangen en door de pensbewegingen uit de wand trekken. Een magneet blijft levenslang op de netmaagbodem liggen en kan preventief worden ingezet.



Kooimagneet  
€1,37 per stuk

## Verwerpen bij melkvee

Een verwerper is een dier dat zijn vrucht afstoot tussen de 100 en 260 dagen drachtlengte en is voor het gemak op te splitsen in infectieuze en niet-infectieuze oorzaken.

Het is een probleem dat in principe op elk bedrijf wel eens voorkomt (in wisselende mate), maar zolang dit niet bij meer dan 2% van de dieren gebeurt is er geen reden tot paniek.

### Infectieus

In het verleden was Brucella de belangrijkste oorzaak waar naar gezocht werd, omdat dit ook voor mensen besmettelijk is. Hierom geldt er nog steeds de verplichting om elk dier dat verwerpt binnen 7dg hierop te laten onderzoeken. Er is daarvoor een fonds die dit voor de veehouder vergoed (via de dierenarts). Daarna is het verboden het dier af te voeren zolang er geen negatieve Brucella uitslag binnen is.

Verwerpen kan echter ook te relateren zijn aan andere dierziekten op een bedrijf (bv IBR-BVD-Salmonella-Leptospirose), de bedrijfsvoering (veel aanvoer van dieren of dekstieren) of andere oorzaken van insleep (aanschaf puppy - Neospora).

In principe kan elk van deze infecties middels bloedonderzoek aangetoond worden.

### Niet-infectieus

Er zijn ook allerhande niet-infectieuze oorzaken op te noemen gaande van per ongeluk een drachtige koe tochtig spuiten tot genetische afwijkingen van de foetus en (hitte)stress. Deze oorzaken zijn echter lastiger aan te tonen of bewijzen.

Adviezen:

- Verwerperonderzoek is verplicht en word vergoed (inclusief visite van dierenarts). Laat dus elk dier dat verwerpt onderzoeken, de meeste kosten worden vergoed door het fonds of betaal je al voor via programma's bij de Gezondheidsdienst. Bovendien kunnen hiermee infectieuze oorzaken aangetoond worden die je kunnen helpen om een verdere uitbraak van een ziekte of nog extra verwerpers te voorkomen.
- Laat elke verwerper ook aanvullend op Neospora onderzoeken. De meeste bedrijven nemen niet deel aan dit programma van de GD, en testen dus niet standaard. Dit terwijl het merendeel van de bedrijven onwetend wel 1 of meerdere Neospora koeien hebben lopen.

## Nieuwe producten

Op steeds meer bedrijven zien we de laatste tijd een toename in uiergezondheidsproblemen. Variërend van meer klinische uierontsteking gevallen tot een oplopend tankcelgetal. Door de diversiteit aan kiemen en verschillende verspreidingspatronen in het belangrijk om eerst te achterhalen welke mastitis verwekkers een rol spelen op uw bedrijf. Als dat bekend is, kunnen alle risicofactoren worden besproken om verspreiding te voorkomen.

Als de randvoorwaarden goed zijn (melktechniek, droogstand- en fokmanagement, hygiëne, voeding, huisvesting, strooisel, comfort van de koe, lucht- en waterkwaliteit en gezondheidsmonitoringzijn) kan vaccineren een extra zetje zijn om nog betere resultaten te behalen.

### Startvac

Dit vaccin bevat stammen van *Staphylococcus aureus*, Coliformen en coagulase-negatieve stafylokokken. Het vaccin kan worden ingezet op bedrijven met (veel) ernstige Coli-mastitis gevallen om de verschijnselen te verminderen. Ook kan het worden gebruikt op bedrijven met een hoog celgetal probleem veroorzaakt door *S. Aureus* en/of CNS om het aantal nieuwe infecties te verlagen en uitscheiding te verminderen.



### Ubac

Dit vaccin is geschikt voor bedrijven waar *Streptococcus Uberis* de belangrijkste probleemveroorzaker is. Het helpt het aantal klinische mastitis gevallen verminderen, verlaagt het celgetal in kwartieren waar *S. Uberis* zit en het zorgt voor minder melkverliezen.



Neem voor meer informatie contact op met uw bedrijfsdierenarts.

Medicijnbestellingen: [apotheekrund@vc-someren.nl](mailto:apotheekrund@vc-someren.nl)

Uw dierenartsen

Stijn van de Voort - Iris Siemons - Stef Frenken - Robin Peters

Tel: 0493 - 44 10 32

Email: [herkauwers@vc-someren.nl](mailto:herkauwers@vc-someren.nl)

Website: [www.vc-someren.nl](http://www.vc-someren.nl)